

萬氏家傳育嬰

萬氏家藏育嬰家秘卷之四

羅田密齋集 全錄

瘥疾

瘥論經中五六般

時師總號是脾寒

治分三法須求瘥

不及家傳平瘥丸

瘥疾之候始而呵欠繼而足冷面色青黃身體拘急
懷鼓顙腰脊俱痛寒去未几乃外皆熱頭痛而渴但
欲飲水嘔惡煩滿而不嗜食者皆其候也按內經有

五臟瘕有六經瘕之病名世人總論之曰脾寒蓋脾胃者五臟六腑之本也經云邪之所湊其氣必虛小兒脾胃素弱故邪乘虛入隨其所入而為五臟六腑諸瘕之名也故吾之先人分為七瘕風寒暑濕食鬼勞也治瘕之法初則截之謂邪氣初中正氣未傷故先驅之使去不可養以為患也中則和之謂和氣漸入正氣漸傷或於補氣血藥中加截藥或於截藥中加補氣血藥務適其中以平為期末用補法謂邪久不去正氣已衰當以補其脾胃為主使正氣復強邪氣自退矣余各因七瘕條陳三法於后以為後學

之蠅墨也

風瘥者因感風得之惡風自汗煩渴頭疼風陽氣也故先熱後寒初得之宜發散麻黃白朮湯主之不退者小柴胡湯加常山枳櫚烏梅截之久瘥不已宜補中益氣湯主之

麻黃白朮湯

治感風發熱瘥

麻黃

去節

桂枝

青皮

陳皮

川芎

白芷

半夏曲

紫蘇

白茯苓

白朮

桔梗

甘草炙

加細辛

枳櫚等分

為散量兒加減姜枣引煎

未發前二時服

寒瘧者因感寒得之無汗惡寒癢疼面慘陰氣也故
先寒後熱宜與發散寒和養胃湯加桂主之如不止
以平胃散加枳椇草葉截之瘧久不止白朮散去乾
葛加乾姜主之

養胃湯

治感寒發瘧

草菓

藿香各五錢

陳皮

七分半

甘草

桂

各二錢

為末入生姜烏梅煎服量兒大小

暑瘧者因傷暑得之陰氣獨微陽氣獨發但熱不寒
食不泄煩渴且嘔肌因消瘦宜解暑毒柴胡白虎湯

主之不止者去石膏加貝母常山栝柳截之又不止者補中益氣湯主之

柴胡白虎湯

治傷暑發瘧

即小柴胡合白虎湯

也

濕瘧者因冒襲而濕汗出澡浴坐卧濕地得之身體重痛肢節煩疼嘔逆脹滿宜胃苓湯主之不退以平胃散加茯苓樛櫚常山截之不退宜參苓白朮散主之

胃苓湯

治傷濕發瘧

即平胃五苓二方相合也

食瘧者一名痰瘧飲食不節飢飽有傷致然也凡食

消生冷燒藏魚肉肥膩中脘生痰皆為食癰其候若
飢而不食食則中滿嘔逆腹痛宜去其食積四飲飲
主之不止以二陳湯送下紅丸子截之以不已宜六
君子湯加青皮主之

四飲飲 治食積和胃消痰

半夏

人參

茯苓

白朮

橘皮

生薑

烏梅

大棗

各一分

甘草

炙或半

右以咀用塩少許水浸濕紙厚裹慢火煎宜量兒
大小水煎服

紅丸子

治今瘰癧食積氣滯腹脹

三棱

水浸軟切片

木根

青皮

陳皮各五

胡椒

乾姜各三錢

米醋煮梗米粉糊丸粟米大紅丹為衣十九至二十五丸二陳湯不

鬼瘡者如瘰癧傳染之病山溪癰瘡之毒客忤無辜寤寐驚怖之變皆是也氣之所中化為毒涎乃生寒熱是也名鬼瘡俗用符水退之此龍木王所咒雷由利及針間有使穴而愈者有針鞋帶五毒而愈者至一草一虫皆可怯之信乎治病尚無正方也宜先用

截藥逐出惡涎後用發散之藥解其毒氣不退用柴胡湯調之

鬼哭飲 治瘡久不愈者 鱉甲

常山 檳榔 白茯苓 酥炙等分

右咬咀用桃柳枝七寸同煎臨發日五更服服吐

惡涎

四聖丸 治諸瘡不分遠近

穿山 二錢半 房炒至 鷄骨 常山

檳榔 黃另研末 烏梅 炙

水煎糯米糊丸隨大小吃紅丹衣十五丸至三十

臨發五更溫酒送下

神應丸 祛癰有驗

當歸酒蒸自柴胡各一兩 穿山甲切及知母

酒糊丸臨發前夜用清茶朝北服一次至發日五

更文朝北服一次

五神丸 治瘧疾萬應 東方巴豆五錢

射二分半 南方官桂五錢 朱砂

白凡各二錢 北方青代錢五錢 黑附子錢二

中央硫黃錢五 雄黃錢一

定於五月五日各條為未按方包放至午時取五

家粹吳為九梧桐大每服一丸綿裹於未發前一
日晚男左女右塞鼻孔中立效

大和湯

發散毒氣

人參

葷果

知母

貝母

烏梅

白芷

枳殼

柴胡

等分

常山

加

咬咀大棗調水各半未發前一日煎露一宿臨發

五更服或香蘇散加川芎白芷蒼朮當歸烏梅

柴胡湯

治瘡久不愈

柴胡半夏與黃芩

耳草常山白茯苓

蒼朮烏梅姜蔥果

枳殼蘇葉及青葉

水煎服

如前數症經久不瘥真氣已耗邪氣猶存則有所謂
勞瘥者焉治法又不同

勞瘥者表裏俱虛真元未復疾雖暫止小勞復發謂
之勞瘥久瘥成勞者是也當調養氣血加減十全大
補湯主之

十全大補湯即八物湯加黃芪官桂是也再加陳皮
半夏姜枣煎服

瘥毋者彌年越歲經汗吐下榮衛虧損邪氣伏藏
間結癥瘕謂之瘥毋此症不可急攻當補其胃氣以

漸而攻經云衰其半而止也蠶甲飲子主之

蠶甲飲 治瘡久不愈腸中結為癥瘕名曰瘡母

蠶甲 君 諸灸信用

黃芪

人參

當歸

白朮

茯苓

川芎

白芍

耳草

陳皮

青皮

半夏曲

三菱

枳殼

厚朴

柴胡 等分

右吹咀加生薑 三烏梅 煎

聚傳秘法瘡不問遠年近日不瘡不截通用平瘡養

脾丸主之試甚驗誠治瘡之神也

人參

白朮

白朮

炙草

陳皮

青皮

半夏曲

蒼朮製

厚朴

草果仁

柴胡

黃芪

豬苓

澤泄

桂枝

常山末

驚甲醋

當歸

川芎等分

十九味各取末和勻酒糊丸黍米大米飲下有癖塊加山陵莪朮各煨研入內

有食瘡成癖又復傷食腹中有癖按之堅硬漸熱無時多哭者前方去蒼朮草果常山黃芪豬苓澤泄加炙芪黃連木香砂仁夜明砂乾蟾炙使君子肉神曲

麥芽等分為末。神曲糊丸。米飲下。

有病瘧又發搐者。此亦食滯積瘧也。熱甚生風。痰壅作搐。只止瘧。驚搐亦止矣。宜小柴胡湯加大黃。常山。枳櫚主之。如不止。驚瘧俱發。以致肝旺脾衰。變為疳症。顙陷唇白。頭髮成穗。宜兩治之用。加減當歸龍薈丸。以平肝內滯。治疳之藥。不用加減參苓白朮散。為丸。以補其脾。內滯退。驚之藥。試之甚驗。

加減當歸龍薈丸 治疳熱發搐。不治驚疳。

當歸

川芎

胆草

龍薈

黃芪

黃連

半夏曲

青皮

柴胡

人參

白朮

不香

耳草

枝子等分

神曲糊丸竹葉易下

加減參苓白朮丸

治瘰癧久成疔謂之疔瘰癧又名勞

瘰癧兼治脾虛生風發搐者用之神效

人參

白朮

白朮

耳草

黃芪

白芍

官桂

陳皮

山藥

連肉

使君子

驚風

神曲

夜明砂

龍胆

南星

荷葉浸水煮糊丸黍米大米飲下此典土二方因

皇兒病製而載之也

有驚后變瘡者此脾虛也。宜平瘡養脾丸琥珀抱龍丸相間服之。

有瘡後變驚者此脾胃虛也。亦如前二方相間服之。有瘡後變驚者此脾胃虛極也。乃慢驚風症難治。宜加減參苓白朮丸琥珀抱龍丸主之。有瘡痢並作者初用小柴胡加當歸白芍常山檳榔大黃主之。不已者只用參苓丸和之。瘡後變痢者此胃氣下陷也。宜補中益氣湯加

黃

木香

有瘰泄並作者均用柴苓湯主之

瘰後變泄者宜胃苓丸和肉豆蔻丸服之

有瘰後變咳嗽者此因瘰退後復傷風也宜微發散
參蘇飲主之

有瘰後浮腫者此病極多宜胃苓丸五皮湯下或用
胃苓湯合五皮湯同服

有瘰后腹脹者看有癖無癖有痞者從痞治宜前平
瘰服脾丸加治癖腹脹法治之無癖者治腹脹胃苓
丸宜多服

有瘰後食少黃瘦不長肌肉者此癖也謂之癖虛之

肥兒九和平瘡丸主之

瘡疾灸法如人不止灸大椎一穴。內庭二穴。在足大指次指外間隙中各一壯。

九瘡之盡發者宜用酒法。有夜發者此和在血分也。宜麻黃桂枝湯加地黃紅花主之。不止者以小柴胡湯合四物湯加升麻治之。提至陽分然後用當歸茯苓主之。常山樛榔烏梅截之。

瘡有一日一發者易已。有間日一發二日一發者難已。惟平瘡養脾丸服久則以漸移近。至一日二發者得汗而解。俗人見其服藥之後反愈。曰發有疑而

不肯服者不可與言藥者也

腫病症治

面目浮腫先受風

濕從足起變形容

補中上下分消去

下水通腸是下工

醫初科論小兒腫病與大人同法率用行水之藥誤
人甚多惟錢氏之論可宗錢氏云腎熱傳於膀胱膀
胱熱甚逆於脾胃脾胃虛而不制水腎水反尅脾隨
水而行脾主四肢而身面皆腫也若大喘者重也何
以然腎水勝而尅退脾土土勝心火火勝肺金肺為
心尅故喘或問心形肺本見虛金何喘實曰此有二

一者肺大喘此五臟逆一者腎水氣上行傍侵於肺故令大喘此皆為難治也腫病之後日胞上下微起肢體重著喘咳怔忡肢間清冷小便澀黃皮薄而光按即成疳舉手即滿是也

治腫之方諸家只知治濕多利小便之說執此一端遽用泄水之藥則一泄而水消乃曰得泄之力殊不知脾愈泄而愈虛不逾旬日腫復如初此世人只知泄水為最而不知十補勿一攻之論往往多死者矣吾之家傳大兒用胃苓湯小兒用胃苓丸以五皮湯送下甚驗

胃苓湯治腫之要藥也。方見解胃。即五苓散以治之。

五皮湯

桑白皮

大腹皮

茯苓皮

生姜皮

五加皮

等分

喘甚者加真蘇子。右上二方有加減法。上半身腫多者加蘇葉。阿子葛根。下半身腫多者加木通木瓜。腹脹者加木香藿香枳殼。大便秘者加枳實大黃微利之。或枳朴大黃丸亦効。方見傷食

飲食之忌。惟鹽醬醢。鮮濕面皆味鹹。能助水者。並他生冷毒物亦宜戒之。恐傷脾胃。重則半載輕者三月。

須待脾胃平復血氣充實然後於飲食中旋以少炒
塩徐徐投之。不至驟吃鹹物則腫自不再作。故劉云
治腫非難補養尤難。

丹溪治腫大法云。宜補中行濕。利小便。腰以上腫宜
發汗。若遍身腫煩渴小便赤澀大便秘結此屬陽
水。先用五皮散。次用四磨飲。加生枳壳。重則疎鑿飲
子。若遍身腫不煩渴大便溏小便清少此屬陰水。宜
實脾飲。或木香疏氣飲主之。
氣若陷下用二陳湯加升提之藥。能使大便潤而小
便長。如腹脹少加厚朴。佐氣不運加木香。木通以調。

之

按丹溪治腫之法大人小兒同用方見名書可尋用
之今予做其法以治小兒之腫如在表有熱可汗者
用五皮湯加麻黃葛根紫蘇杏仁以發之如身無熱
水氣在裡者用五苓散加醋炒芫花果實以下之陽
水之大便秘小便澀煩渴者用五苓散作湯送下枳
朴大黃九陰水之不潔清便自調者用平胃散加生
姜白朮草果木香藿香主之

病有癰後腫者有泄痢後腫者有因咳嗽腫者有因
疥癩腫洗後腫者腫雖不同治法則一也經云去陳

芫莖者謂腹有積聚宜去之也。開鬼門謂發其汗也。潔淨府者謂利其小便也。溫衣者謂常宜和暖使水氣得行也。大抵癰痢後腫者難治。脾胃虛也。咳嗽而腫者宜玉皮湯。去五加皮加地骨皮。陳皮去白紫蘇。主之。氣上逆者更加杏仁。葶藶。瘡毒痛者通聖散。大凡腫先起於腹而散於四肢者可治。先起於四肢而歸於腹者不可治。若鼓脹而肚上有青筋脹滿大便滑泄久瘧而轉作虛浮與夫肉黑傷肝缺血平傷心臍實傷脾足平傷腎皆平傷肌。凡此皆為不治之症。又男從臍下腫而上女從身上腫而下或內便或

掌平或如腫脰長或面焦黑者皆不可治也

依一段

脾肺經今屬大陰

喘呼腫脹每相尋

視其標本分先後

秘訣家傳記在心

病腫者未必不喘病喘者未有不腫皆濕土之病也

蓋脾肺者手足太陰皆屬濕土故腫乃濕土敷阜之

家端乃濕土薰蒸之氣治者須以標本先後立法也

如先重後喘者此脾病肺也以脾為本肺為標宜胃

苓五皮湯如上法合而用之如先喘後腫者此肺

傳脾也以肺為本脾為標宜蘇子降氣湯主之

腹脹

腹中脹滿定虛寒

秘結須從實熱治

熱多寒少休妄議

虛虛實實天人竿

大抵小兒多因飲食飢餓生冷糾膩聚結不散或因
久患疳積及瘧后癰塊不消皆能為脹按之如鼓膨
脹者是也故有疳脹虫脹積脹食脹虛脹冷脹種種
不同一言以約之寒脹是也故疳虛者皆屬寒宿食
積癖皆屬熱各隨虛實主治庶不差誤

錢氏云小兒腹脹由脾胃虛寒故作也實者悶亂喘
滿也可下之不喘喘者虛也不可下若誤下致脾虛
氣上附肺而行肺與脾子母皆虛肺主目胞腮之類

脾主四肢。母衰甚，必主目胞腮腫也。黃色者，屬脾。治用弱氣丸，漸消之，使上下分消其氣，則愈也。

小兒易為虛實。脾虛不受寒，溫服；寒則生冷，服熱則生熱。當識此意，勿誤也。

凡治小兒虛腹脹，先服弱氣丸。不愈，腹中有食積，結糞，小便黃，時時微喘，脉伏而實，時時飲水能食者，可下。疳木香檳榔丸主之。脾初虛而後有積者，不可便下。以肥兒丸調之，不愈，以三菱丸主之。

弱氣丸 治小兒虛腹脹大者，加蘿蔔子、名揭丸、子。

胡椒一兩

蝎尾

去毒五

蘿蔔子

加陳皮

青皮

木香 各三錢

為末 麵糊丸 粟米大 服五七丸 陳米飲下

三菱丸 治先脾虛後傷食不可下者反疳疾腹脹

三菱

醋炒煨

莪朮製

青皮

陳皮

枳實

厚朴

麥炒

半夏

薑汁炒

黃連

炒

香附

醋焙

川芎

使君子

夜明砂

神曲

麥牙

乾蟾

瓶存性

檳榔

木香

砂仁

各三錢

當歸

一錢

另取神曲煮糊丸黍米大服二十丸至五十丸米飲下大便黃涎臭穢為度此積滯去也

治小兒腹脹法

用蘿蔔子炒

紫蘇根

干葛

陳皮等分

耳草少許

煎服食少加白朮

一法 用蝦蟇一箇入猪肚內煮熱去蝦蟇將肚食

盡效

如有因食積而腹脹者有熱用木香枳榔丸有寒用

丁香脾積丸有因食多肉多腹脹皆用三黃枳

料內加香附半夏蒸餅丸服

實者宜下之消之次補之虛者溫之升之補為要也

寸經曰夫脹者皆在臟腑之外排靠臟腑而廊胃腸

脹滿皮膚故曰脹大抵寒脹多而熱脹少治宜詳辨
之如腹脹時減者為虛腹滿不減者為實按之濡者
為虛按之堅者為實如大病瘥痢之後脹者為虛外
感風邪寒邪入裡者及傷飲食者其脹為實虛者補
之內加行氣之藥勿太犯溫及成熱中也實者下之
以加補脾之藥或先補脾而後下之勿太下之恐傷
胃氣常用秘胃苓丸以紫蘇湯下多服
病脹氣喘者宜分氣飲主之

分氣飲 治腫脹

桔梗

赤茯苓

陳皮

桑白皮

大腹皮

枳殼

半夏

藿香

紫蘇

耳草

每服一錢水一小盞姜三束二煎服

病脹者腹堅而大腹皮無文臍突背平胸高而喘或滑泄皆不可治

內經曰五實者死腹緊服一也氣上喘二也身壯熱三也脈洪數四也大小便秘五也如此五實者宜急下之得利者生神效丸主之方用

大戟

芫花

耳遂

醋炒

澤泄

葶藶

連翹

桑白皮

木香

赤小豆

黑牽牛

取頭末等分大棗蒸去核搗泥丸麻子大量兒極
柳湯下以利為度此乃救急之方非可常用得利
后用參苓白朮散去甘草補之

黃疸

濕熱食傷總發黃

是名疸病屬純陽

熱宜寒治濕宜利

從消導良

錢氏曰凡小兒身皮面目皆黃者黃病也身痛轉背
強大小便澀一身面目指爪皆黃小便如屋塵色著
物皆黃渴者難治此黃疸也二症多得於大病之后
又有生下百日及半年不因病遍身微黃胃熱也大

人亦同。又自面黃腹大口渴者脾虛也。又有自生面
身黃者胎黃也。經云諸疸皆屬於熱。色深黃者是也。
若淡黃兼白色胃怯不和也。

按論小兒黃疸病錢氏甚詳。如因熱者其色黃而明
因濕者其色黃而黯。因食積者其色黃而淡。以此辨

明。丹溪云不必分五疸。總是濕熱。如金匱相似。此理甚

按經中只言瘵。俗稱為疸。瘵者單也。謂單陽而無陰
也。因於熱者用涼驚丸。因於濕者用胃苓丸。內加茵

陳作九服之。因於食積同疳黃者集聖九脾胃虛怯
而黃者肥兒丸此家秘之法也。方見前大抵治黃胆
者茵陳五苓散尤為穩當錢氏泄黃散治脾熱發黃
大槩治小兒季夏之時身體蒸熱胸膈煩悶如爛捕
之黃服中白睛赤黃筋骨痿弱不能行立用加減泄
黃湯主之。

黃連

茵陳

各五錢

黃蘗

黃芩

茯苓

山枝仁

各二錢

澤泄

二錢

以咀作一服水煎稍熱服此方治濕熱發黃甚效

丹溪治小兒吐泄黃胆方

三菱

莪朮

青皮

陳皮

神曲

麥牙

先吐泄者方曰霍亂
多連及赤白者
不傷食傷濕者

黃連

甘草

白朮

茯苓

分

未溫水調服傷乳食吐泄加山查時氣吐泄加滑
石發熱加薄荷此方治傷食及食積發黃甚効

凡小兒有食積者面色多帶黃白宜肥兒丸調之健
脾益胃出積消食脾胃既和飲食消退運化積微灌
洗臟腑流行榮衛自然五色脩明其黃去矣

腹中有癥者宜化癖丸

方見

癖有積者三

方見

各依其法治之無有不驗者惟幼生小兒胎黃用生
地湯與母服之兒食乳其黃自退

生地黃湯

生地

赤芍

川芎

當歸

天花粉

分等

水煎服

腹痛

小兒腹痛哭聲連

大者能言何處疼

冷熱積正分四症

盤腸內弟察根源

仁齋云腹痛之病因邪正交攻與臟氣相擊而作也

挾冷痛者於面色或青或白見之冷甚者則面色黑

黑唇爪甲皆青矣輕者當歸散重者燒脾散主之有

吐痛者保童丸

當歸散 治腹痛有寒無熱

當歸

木香

陳桂

人參

甘草等分

生姜大束引溫服

燒脾散 治傷生冷菓菜停積中焦心脾冷痛

乾姜生

厚朴炒

草菓仁

砂仁

神曲炒

甘草炙

麥牙

陳皮

良姜炒等分

末熱鹽湯點服。或煉蜜丸如圓眼大姜湯化一丸

下

保童丸 治因寒傷風冷食積肚疼吐泄嘔惡

人參

白朮

甘草炙

蒼朮炙

厚朴姜

陳皮

茯苓

猪苓

澤泄

藿香

丁香

半夏曲

干姜

辣桂

白豆蔻

青皮

肉豆蔻

滑石

全蝎

木香

訶子肉

神曲糊丸龍眼大一丸米飲下 或用理中丸

苓九合秤細煨姜湯調服已見驗

挾熱痛者於面赤壯熱四肢煩痛手足心熱見之宜

四順清涼飲加青皮只亮大便秘育枳朴大黃丸主

之方見類聚 大便調者芍藥甘草湯

四順清涼飲

白芍

當歸

升草

大黃等分

芍藥甘草湯

白芍

用倍

甘草

己土二方並用水煎服

錢氏云小兒積滯口中氣溫面黃白目無精光或白

睛多及多睡畏食及大便秘或酸臭者當磨積宜三

消積丸主之甚者脾積丸下之主后和胃胃苓丸養

脾丸肥兒丸參苓白朮散擇而用之

三麥消積丸

治積滯胃脘痛心腹痛小便痛痞痛

虫痛

三菱煨

莢米煨

半夏

以實

黃連

其莢水拌炒陳皮

青皮

木香

檳榔

厚朴

川練子肉

小茴
等分末

另取神曲糊丸黍米大服二三十丸米飲下

至痛面脫白心腹_口中涎沫及清水出發痛時烏

梅丸主之小兒本怯者多此病

積痛食積虛痛大同小異惟至痛口涎而沫出甚者

化至丸萬應丸看病輕重用

烏梅丸 治胃冷蛇攻心痛嘔吐四肢冷

烏梅 三十个 黃藥 炒

細辛 肉桂

附子 炮各六錢

黃連 一兩六錢

蜀椒 去目 當歸 各四錢

姜 炮一錢

末取烏梅肉酒浸杵爛和蜜丸麻子大服十九日

二次忌生冷

化虫丸 治虫交心痛去來不定不思乳食

鶴虱 檳榔

錫灰

苦練根 白皮 錢一

白枯丸 三錢半土半

麵糊丸黍米大服二三十丸熱水入香油三滴吞下食前服如有小虫皆化大玉自利下初服甚效

凡病腹痛喜手按及熱熨者為虛為寒宜用溫補法
如手不可按者為實宜下之。盤腸內疝痛見前驚風
及後疝痛

癖病

癖居脇下狀如魚

寒熱潮時似瘧

虛實從容衰半止

若逢乳癖不須醫

仁齋云癖者血膜包小側癖脇傍時時作痛惟癖能
發潮熱生寒熱故瘡。家中脫多畜黃水日久而成癖
寒熱往來不已者成此疾也。蓋小兒臟腑和平榮衛
和暢則津液自然流通縱使多飲水將不能為病。惟

乳哺失調三焦閉隔水飲停滯腸胃不能宣暢冷氣搏之結聚而成癖也錢氏云腹中有癖不食但欲乳不早治必成疳。

幼科治癖 輕則木香丸。重者取癖丸。似太峻。今予立法。輕則消癖丸。主之。如氣壯實者。代赭石。揆癖丸下之。

按大槩云。一小兒病癖。積在左脇下。硬如覆孟。肚大青筋。發熱肌瘦。咳嗽自汗。目瞤尤甚。牙疳口臭。宣露出血。四肢困倦。飲食減少。病甚篤。太醫劉中安先與沉香海金沙丸一服。下穢物兩三行。次日服癆氣丸。

十日後隨以沉香海金沙丸下之。又服痛氣丸如此
 五換服至月餘其癖減百而愈。良遇近年有此疾獲愈
 者多。故予家秘訣先服消癖丸。五日乃服挨痞丸。以
 微下之。又服消癖丸。十日又以挨癖丸下之。
 內經曰：大積大聚，廼可攻也。衰其半而止。如上法治
 之。待其衰去大半不可再下。只以消癖丸服之。
 消癖丸 治癖在脇下者面黃肌瘦午後發熱似瘧
 薊

人參

白朮

陳皮

白朮

青皮

厚朴

枳實

半夏

砂仁

神曲

麥曲

俱炒
各二

錢

鱉甲

九筋醋炙三錢

三菱

酒

莪朮

酒

木香

各一錢

辣桂

乾姜

錢

各一

黃連

錢

同姜炒丸如黍米大服二十九至五十九米飲下

代赭石揆癖丸

治腹中痞塊或生寒熱或作痛者

代赭石

火煉極細末

酢所

青皮

白

莪朮

煨

木香

下見火

三菱

煨

辣桂

川大黃

三

錢

巴霜

錢

除巴霜外研末入巴霜再研勻醋煮麵糊丸麻子

大服五九姜湯下

小兒病瘡腹中有痞發熱者連年不已欲成疳癆者

宜用蠶甲猪肚丸主之

比柴胡

一兩

黃連

錢七

枳實

木香

青皮

各半兩

九筋蠶甲

醋炙一兩

大蝦蟇

乾者一個炙焦

青蒿

乾者七錢

用積猪肚一個重斤半者去脂將前藥末在內柳

木甌蒸熟同搗和丸麻子大服二三十丸人參湯

不食後服

凡小兒疳癖不必攻治待至長大脾胃漸強自不見矣

虫痛

個個孩兒腹有虫

胃虛蛇動痛相攻

眼眞吐沫如驚癇

寸白為疳法不同

古方論臟腑九虫一曰伏虫二曰白虫三曰肉虫四
曰肺虫五曰胃虫六曰弱虫七曰赤虫八曰蠱虫九
曰蛇虫。蛇虫俗呼食虫者是也。或長一尺或五六寸
蓋因臟腑虛弱而動或因食甘肥而動其動則腹中
痛發則腫聚痛有去來乍作乍止嘔惡吐涎口出清
沫胃傷心者死自鼻出者死先察其脉或腹中痛者
脉常沉伏弦細今反脉大則是蛇痛也蓋因小兒食
物太早或傷生冷油膩之物留而成積積化為虫也
凡有虫者口饒好甜或喜食泥土茶脚火灰之類宜

用取虫之藥如烏梅丸化虫丸方見前木香檳榔丸
蝦蟇丸萬應丸秘傳養寶丹皆可擇而用之

木香檳榔丸 殺諸虫 鷄心檳榔丸一木香

鶴虱 貫衆 錫灰 乾漆炒煙

使君子各半 輕粉二 雷丸白

巴豆錢半 各二

未飛白麵糊丸麻子大服一二十九五更苦練根

白皮煎湯下

蝦蟇殺疳虫丸 大蝦蟇一个 木香

鷄心檳榔 貫衆

桃仁水浸 尖另研

苦練根白皮

酸石榴皮各三錢

燕夷

鶴虱各二錢

巴豆肉二錢另

糯米糊丸麻子大五更石菖蒲下十五丸

高應丸

下諸虫

檳榔末五錢大黃末八錢

黑牽牛

四頭卡

皂角

性者皮不

苦練白皮斤一

將前三味末和勻用皂角搥碎與苦練根皮二味

水一大碗熬成膏入藥末搗丸小豆大用沉香白

雷丸木香三味各研細末為衣先用沉香衣次用

雷丸衣後用木香衣每三九五更沙糖水下

秘傳賽寶丹

追虫取積神效

黑丑

十個末四兩

錫灰

醋炒一兩

檳榔

末二兩

陳皮

青皮

各二兩

膏丸

白者末二兩

三爰醋

我末醋

鶴虱

皂角

各二兩

使君子

二兩

將各末和勻却以各藥粗渣煎湯去渣搗丸麻子
大每服五分至壹錢四更時用冷茶清吞下復睡
至天明不可洗手洗面吃湯物待取下或虫或積
惡毒滯氣并原藥下盡方用冷水洗面其藥未下
寧半時見藥下終用食哺之
凡欲取虫宜在上半月虫頭向上若下半月虫頭向
下不受其藥徒瀉胃氣也取虫之時預將清油煎肉

或煎卵餅令兒與之勿與食也引虫得聞香味皆聚而求食也急接下虫藥乃中病也

取寸白諸虫買穀酒方 隔夜取買穀煮酒收起至次日五更將炙肉一塊與兒啣口中勿令吞下虫聞肉香其頭向上却取去肉以使君子肉三个煨令香熟與兒嚼爛同輕粉數厘吞下少頃以買穀酒下雄黃解毒丸三五七粒則泄下皆虫也

小兒病虫多出於脾胃怯弱者如上攻取之藥豈可常服乃當作腹痛之時然後用之也

有於虫蟲之時常宜服肥兒丸安虫九所謂防患於

未然使之不發也

安虫丸 治就虫寸白虫匿虫一切諸虫

木香

鴉心栴檀

使君子肉

白蕪荑仁

綠色貫衆

苦練根白皮

蝦蟇性存

夜明砂

末梗米九黍米大二三十丸蜜水下

癰疔

疔腫須分內外因

內因氣動外寒浸

病因肝氣原非腎

本腫呼為氣卵名

疔者寒氣結聚之所為故今內則臍腹絞痛外則卵

九種大是也專屬肝經與腎無干蓋肝善怒大叫哭
小兒性急多哭得之者此氣動於內謂之氣疝宜行
氣開鬱加減二陳湯木香內消丸主之如因以坐寒
濕之地得之者此冷氣入腹謂之寒疝宜溫中散寒
加減當歸散茱萸內消丸主之有腫而不痛者此濕
也宜行消腫加減守效丸主之並外敷方
加減二陳湯 治性急多哭卵腫痛連小腹謂之氣
疝

附子

浸便

木香

半夏

洗

白茯苓

川芎

陳皮

去白

小茴

炒等分

耳草

半

姜三片水煎

木香內消丸

治疝氣

木香

三菱根

猪苓

澤泄

川練子肉

陳皮

香附

酒浸七錢半

小茴

炒等分

海藻

洗二錢

青皮

酒糊丸黍米大空心塩湯下二三十丸

加減當歸散 治受寒濕之氣小腹絞痛外腎紅腫

並內釣腹痛啼哭多

當歸

酒洗

萸菜萸

炒

官桂

去皮

川芎

干姜

炮

木香

小茴

炒等分

車草

未服五分至一錢塩湯調

家傳菜萸內消丸

治寒濕所襲番伏作痛癰疽偏

莫菜莢

酒醋浸一宿焙乾

桂心

山茱萸

蒸去核

馬蘭花

醋浸焙

川練子

蒸去核

玄胡索

焙

舶上茴香

鹽炒

橘紅

青皮

白去

海藻

洗去各

桃仁

炒去皮

白蒺藜

炒刺

木香

各半

酒糊丸麻子

大服二十凡至五十丸溫酒鹽湯下

加減守效丸

治卵腫不痛者此溫也又名木腎

蒼朮

炒浸鹽

南星

炮

白芷

各一兩

山查肉

一兩

川芎

橘核

炒

半夏

洗

神曲

炒各半兩

海藻

洗

莫莢

炒

二錢

酒糊丸麻子大服二十至五十丸茴香湯下

一方治疔初起者田五苓散料內加小茴川練肉服時入塩少許效

又方治偏墜痛甚者用川練肉茴香炒等分沒藥全

蝎減半末空心用熱酒調服或以五苓散煎調更佳

傳法 外腎腫大光明者先用退餅煎水乘熱洗過后

用牡蠣灰乾地龍糞焙乾等分末唾津調敷腫上痛

者鷄子清調敷

又方 用乾龍末不拘多少先以葱椒湯洗次以津

調敷

小兒素有疔氣或一年或半年發者發則有形外連

單凡內貫小腹腫硬一條如小杵約五六寸長大小
更不通者宜用

山枝仁

山查子

木香

當歸鱗

川芎

青皮不去

木通

小茴炒

川練子肉

澤泄

猪苓

作大劑

水煎

小兒木腎腫大連年不消者不早治之便為終身疾
癰也宜用前家傳茱萸內消丸內加黑五半生半炒
取頭末二兩為丸服更灸臍傍二穴即章門穴大效
又取穴法以木兒手掌小指後側橫紋按臍中心中
指頭盡處是穴

小腸氣一名鹽腸氣痛發則腰不得伸乾哭無淚額上汗出詳見前內疝病中有方如痛連外腎者宜加減川練子散主之

破故紙

炒二錢

萸菜根

醋酒浸

宿焙

舶上茴香

炒

木香

錢一

米溫酒調服

小兒氣卻謂之偏墜得之於父平已老或年多病陰痿精少強力入房因有此者謂之胎疝難治小兒濕地上坐或為丘蚓呵其却腫長大而垂者鹽湯洗之蓋鹽能殺蛆毒也或用浸蒼朮并煎熱少以鹽在內洗之

小兒疝痛及盤腸痛者以鹽一合炒熟放兒臍中慰之待冷更以艾在臍上灸之溫氣既入和氣隨散其痛立止

小兒陰囊生瘡潰爛者謂之脫囊用紫蘇葉研末敷之以荷葉包之或用生荷葉火烘令軟包之雖囊九露亦可治之神效

又治外腎燥痒潰爛用

龍骨灰

石膏

多年爛蚌壳

錢一

爐耳石煨

五倍子

白芨

黃連 各五分

末先以苦參大腹皮紫蘇露蜂房煎湯先洗拭乾

敷藥神效

小兒外腎臊臭時復濕痒宜用

柴胡

澤瀉各一錢

車前子

木通各五

生地

當歸尾

胆草各三分

咀作一服水三大盞煎一碗去渣待宿食消盡空
心服更以美膳壓之

外腎痒甚不可止者用胡椒煎湯洗之立效

啼哭

孩兒多哭事堪憐
飢渴痒疳如不中

何事漣如晝夜聞
拂其心驚自煩覺

小兒初生百日一週之內神安意靜不妄笑多哭者
易養如日夜啼哭不止者難養啼與哭不同啼者無
時有聲而流淚也哭者時作時止大號跳而有淚也
小兒啼哭非饑則渴非痒則痛為父母者心誠求之
渴則飲之飢則哺之痛則摩之痒則搔之其哭止者
中其心也如哭不止當以意度蓋兒初生性多執拗
凡有親狎之人玩弄之物一時不在其心不悅而哭
矣謂之拗哭急與之勿使怒傷肝氣生病也假如又
不止請醫視之如大斗哭晝夜不止者肝熱也宜瀉
青丸主之淡竹葉湯入沙糖一豆許化下如日夜啼

哭身熱煩燥者心熱也。宜導赤散加黃連。燈心湯服。或用東垣硃砂安神丸。燈心湯下。神效。二方俱見心肝

夜啼

夜啼四症驚為一

無淚見燈心熱煩

面瑩頰青下臍痛

睡中頻笑是邪干

夜啼者脏冷也。陰虛於夜則冷動。冷動則為陰極發。煖寒甚作痛。所以夜啼而不歇也。釣藤散益黃散主之。

釣藤散 腹痛夜啼晝則安靜者又治內釣

釣藤

茯苓

茯苓

川芎

當歸

木香

各一分 單大錢

量兒或末五分至一錢姜枣罌煎服

又方治夜啼不止腹中疼痛

甘草

黃芪

當歸

赤芍

木香

分等

末每少許塗乳頭上吃之

又方 木香磨水半盞調乳香沒藥末少許數沸服

之立効

其心熱煩啼者必有臉紅舌白赤澁之病宜導赤散

加麥冬燈心或東垣安神丸甚効

卷之四

頭

三

藏文

又方

黃連

汁

甘草

分

人參

分

末竹葉水煎服

又方

燈花膏

燈花

二枚或四枚

或

珠砂

末以燈心湯調搽兒口中以乳汁嚥下一日三服

小兒夜啼見燈即止者此由點燈習慣乃拘哭也

驚啼者常在夢中哭而作宜錢氏安神丸主之

又方胎中受驚生未滿月而驚啼者用

珠砂

牛黃

射各少許

末取猪乳汁調搽兒口中

又方

蟬退

十四枚全去足

入硃砂

許

蜜調服

有因客忤觸犯禁忌而夜啼者宜四聖保命丹用燈草燒灰和藥杵細乳汁調塗乳上令兒吃之更以術法驗之

一法於兒臍下用硃筆書田字一個即瘥

又法用大柴頭一個長四五寸削平一面硃砂水寫云撥火杖撥火杖差來作神將捉著夜啼鬼打殺不要放急如律令勅

又方用仙人杖安睡處身伴此杖即筭欲成竹者立死

又方 用抱雞婆草一束置兒簾下勿令人知

諸汗

額頭有汗不須疑

漿漿渾身早問醫

若待陽虛成脫病

縱逢國手也虛題

內經曰陽者衛外而為固也陰者內之守也氣為陽血為陰心主血汗者心之液也肺主氣皮毛腠理肺之合也小兒心火太盛上薰於肺則皮毛不斂腠理不密失其衛外之職矣故汗出焉或為自汗或為盜汗血亦失其守矣汗出不止心亦虛也氣弱血虛大病生焉縱遇良王不可為也

自汗者或昏或醒浸浸而出不止也盜汗者睡困則出醒而復收也並宜黃芪六黃湯止汗散主之當歸六黃湯此治自汗之聖也

當歸

二地

黃柏

黃連

分等

黃芪加倍

先用浮麥熬成湯去麥入藥煎成劑去渣調止汗散服

止汗散

用故蒲扇燒灰

又方

用牡蠣

米泔浸洗煨透末

麻黃根

黃芪

案灸各末

取浮麥一百粒煎湯調煎一沸服効

錢氏云。上至頭。下至項。謂之六陽虛。汗不須治之。

小兒睡而自汗者。肌肉虛也。止汗散主之。適身汗出

者。香瓜丸主之。上至胸下至臍。胃虛也。當補脾。益黃

散主之。幼科執此。殊不知自汗者。心火旺而肺金虛

也。反用丁香。以助火。青皮。以瀉肺。其失甚矣。東垣有

論。見肺。本方當歸。調元湯。加芍藥。黃芪建中湯。穩

當

黃芪建中湯

治脾胃自汗

黃芪 蜜

白芍 等

甘草 炙

杜桂 減

姜三 束引

又方

黃芪六錢 炙甘草六錢 名黃芪六乙湯

加白朮

白芍各三錢

末姜枣引治胃脾虛汗甚効

凡兒初生週歲不可自汗勿用他藥宜用白朮一錢
小麥百粒水煮令乾去麥為末以黃芪湯調服愈
為度

有傷風寒熱症自汗宜小柴胡湯加牡草治之

有夏月中暑濕發熱汗多者宜人參白虎湯加蒼朮
治之効

有傷食積者胸腹多熱有汗宜先去積三黃枳朮丸

下之後以肥兒丸調理自愈

有因瘧後自汗者宜小柴胡湯加黃芪桂枝主之
有因瀉痢後自汗者宜黃芪建中湯加當歸白朮主之

有急驚風自汗者通身如水之冷此危症也難治
凡大病後有自汗盜汗者宜調元湯加白芍白朮主之
如汗出太多不止者宜養心血團參湯聖藥也
團參湯 治虛汗或心血液盛亦發汗此藥收斂心
氣

新羅人參 川當歸 各三分

咀作三服實情心一个切三片每片入藥二錢并

水碗半煎一碗食後服

又治睡中汗方

酸枣仁

人參

煨苓

蜜丸焚實大寒冬湯一丸下

汗出不治症 汗出不流而髮潤一不治也 汗出如
注者二不治也 汗凝如珠者三不治也 君子見機而
作不可不早

大小便病

腎竅便開前後陰

便溺有病屬肝經

血虛大便多硬結

氣熱常為小便淋

內經曰腎開竅於二陰二陰者前陰竅出小便後陰

賁出大便也

又曰肝病者則大小難故中風者多便溺之阻隔也
又云前陰主氣後陰主血者語其用也蓋膀胱之津
液血所化也由氣而後能出太陰之傳送氣之運也
由血而後能潤此便溺之流通然後見氣血之依附
也夫人之所以有生者以有出入也如清陽出上竅
謂呼吸也濁陰出下竅謂大小便也一息不運則機
絨窮而死矣故二便通加以腹脹氣喘嘔噦煩燥
者不可治也宜服
後俱通矣
小用掩臍法密導法則前

八正散

治熱聚下焦二便不通

木香

滑石

山枝仁

車前

瞿麥

升草

大黃

芒硝

分

水一碗先煎上六味二沸入黃煎至半碗去渣入

煎一沸頃熱服

掩臍法

治驚風積熱大小便閉塞用連翹葱七根

不洗帶土生薑一鬼淡豆豉二十一粒鹽二匙同

研爛作餅銚子烘熱掩臍中以綿扎蓋良久氣通

自利不然再換一餅

又方

用大田螺三五枚和殼杵爛掩臍下即通每

簡加鹽半匙更急

導法 治二便不通以此通其大便則下焦氣行而小便自通矣用蜜煉成珠滴水不散入皂角末和丸如小指頭大似葱管送入穀道中氣通則便通矣

治小便

膀胱不利號為癰。

不約遺尿夢寐中

如此兩端分冷熱

還來水火覓真機

經曰膀胱不利為癰不約為遺尿癰者小便不通也又曰脈有熱則小便先赤凡小便赤澀為熱小便自

遺為寒熱者火有餘水不足治宜瀉心火滋腎水加
味導赤散主之寒者火不足水有餘也治宜溫腎水
益心火益智仁散主之

加味導赤散 治心熱肝熱小便赤澀者

木通

生地

甘草稍

條芩

枝子仁

澤泄

車前子

柴胡稍

等分

末每一二錢淡竹葉七片燈心二寸水煎食
前服

益智仁散 治遺尿

益智仁

破故紙炒

白朮等分

細末鹽湯調服

小便不通乃內臟氣虛受熱壅滯宣化不行非塞非痛但閉不通腹脹緊滿宜五苓散加車前子燈心主之

有大病後氣虛津液少者不可利之利則氣益虛津液日枯宜人參麥冬甘草稍等分

黃柏鹽水炒

末煉蜜丸姜湯下

小兒諸淋不問五者皆屬於熱並用

香附子

川芎

赤茯苓

各半兩

海金沙

滑石

各一兩

枳壳

澤泄

石常

檳榔

各二錢半

糯米粉煮糊丸麻子大服二三十九順取長流水入鹽少許煎湯下

如小兒氣病常病淋者不可服上藥宜補腎地黃丸甚効小便自出而不禁者謂之遺溺睡裡自出者謂之尿床此皆腎與膀胱虛寒所致也宜鷄腸散主之

用鷄腸

一具

牡蠣

煨灰

白茯苓

真桑螵蛸

自下者

微炒

辣桂

龍骨

各二錢半

末服一錢姜枣引或與益智散令末煉蜜丸鹽湯下尤妙

小便出血者謂之尿血用

生地

木通

甘草稍

赤茯苓

山枝仁

生蒲黃

滑石分

末每一錢淡竹葉七片水煎去渣入車前草自然

汁同服

又方 用升麻甘草煎湯調一元散服

小兒初出便黃赤落地良久凝如白膏者謂之尿白

幼科云久則成疳是也宜用胃苓丸鹽湯下效

如小便出而色白渾濁謂之白濁宜清心蓮子飲主

之

石蓮肉

白茯苓各一錢鹽智仁

遠志

心去

麥冬

心去

人參

各五分

石菖蒲

去

車前子

白朮

澤泄

各二分

耳草

各半

末每一錢燈心同煎

又方分清飲

益智仁去

川蘼薊

石菖蒲

天台

烏藥等分

末或和白朮尤妙燈心湯服

治大便

大便鞭結須宜下

亦有諸般不可攻

食少氣虛脉濡溺

不如胆導有奇功

夫飲食之物有入必有出也苟大便不通宜急下之

使舊穀去而新穀得入也。然有實秘者有虛秘者。臨病之時最宜詳審。如形實氣實。脈實又能食者。的可下之。症則下之。如河澗涼膈散。承氣湯。八正散。二黃枳木丸。木香枳實丸。丁香脾積丸。擇而用之。中病即止。不可過也。如形虛氣虛。脈虛又食少者。雖有可下之症。緩則救其本。用保和丸。只朮丸。大黃丸。微利之。如常便難者。血不足也。宜潤腸丸主之。急則治其腸。使其通利。猪胆汁導法。神效。此家秘之法也。

潤腸丸

治老人虛人小兒產夫大便秘結者良驗

麻子仁

去

杏仁

去皮尖

桃仁

去皮尖

枳殼

炒各七

阿膠

二

分半

蘿蔔子

炒

柴蘇

三

陳米湯下

胆導法

猪胆

仁

以

小竹管放

口

內用線扎緊

勿

勿使移動吹氣一口另用一線從管下近氣處繫定

勿使洩了氣揷入穀道中解去繫氣線一手拿住

胆筒一手捏胆汁入腹直待氣通隨捏隨起便即

通矣如不通又有別法口言不盡

凡小兒病有可下不可下者說見第一卷歌中

凡小兒大便下血者宜四物湯加枳殼荆芥穗玄栢

葉主之

小兒目病

存乎人者惟眸子

五臟真氣並見此

一點塵埃不可浸

風熱肝虛為疾耳

目主五臟。瞳人屬腎。黑珠屬肝。白珠屬肺。兩角屬心。上下胞屬脾。目內五臟症。錢氏云。赤者心熱。導赤散主之。淡紅者心虛熱。生犀散主之。青者肝熱。瀉青丸主之。淺淡者地黃丸補之。黃者脾熱。瀉黃散主之。無精光者腎虛。地黃丸主之。白而澁者肺熱。瀉白散主之。

生犀散

地骨皮

赤芍

柴胡

葛根各一兩 耳草兩

生犀兩二錢

每一錢水煎服

眼目視物不明不腫不痛不赤無翳膜或目睛小無
精光者是肝腎俱虛不可便服涼藥宜地黃丸主之
目者腎之竅瞳人者通竅於腎腎屬水肝屬木母子
相依者也故肝腎之氣實則精彩光明氣衰則昏朦
暈眩烏輪赤暈痛淚漿流此肝熱也眼生清淚粘臉
遮睛此肝虛也瞳人散大淡白偏斜此腎虛也瞳人
焦小或帶微黃此腎熱也 虛一實以此驗之然
者神之舍也又為腎之主也心主血目得血而能

心主熱目因熱而昏昧故四物湯與地黃丸要藥也
補腎水制心火養肝血莫有加於是方者矣

一、目痛赤腫有二症或因天行時氣症候暴赤腫痛

晝夜若啼哭不止或因臟腑積熱兩目赤腫並宜

瀉青丸方加 蟬退 白蒺藜炒 蔓荊子

荊芥穗 柴胡 黃連炒酒 車前子

甘草各等分

每末一錢生蜜水調細服之外用金沙散點洗之
方見下

一、目內翳膜有二症或肝腎俱虛眼生翳膜及肝疼

白膜遮睛者宜用地黃丸加

五味

人參

當歸

川芎

黃連

蘆薈

蜜丸服

或因痘疹之後毒氣入目生翳膜者用

白菊花

菡豆

谷精草

等分

咀每二錢乾柿餅一枚粟米泔汁二碗慢火煎乾
去渣於食後臨卧只吃柿肉一日三枚如兒不能
服者將煮過柿餅毋嚼爛喂之

此二症不可用點藥

有物生下眼閉不開者其症有二或因產母食熱毒
物以致斯疾治當以胆草少許蘼洗眼上一日七次

或用黃連磨乳點之乳母服

生地黄湯

生地

赤芍

川芎

當歸

酒洗

瓜蘆根

加黃連

燈心引

水煎或以本方為細末燈心湯調少許擦兒口中

或因初生洗眼不淨穢汁浸漬於眼目中不能開者

宜真金散万

淨黃連

黃蘗

當歸

赤芍

杏仁

去各五
分

切乳汁浸一宿晒為極細末以生地汁調一字點

眼中自開

凡初生小兒頭洗令淨使臉赤爛至長不瘡名曰胎

赤見下爛弦

痒服者肝風入眼赤腫目生眵淚爛弦痛痒操擦
暗雀盲甚至目合不開宜

天麻丸

真青黛

黃連

天麻

五靈脂

夜明砂

川芎

蘆薈

各二錢

胆草

防丰

蟬退

去足錢

全蝎

二枚

乾膽

炙焦三

射

許

猪胆汁浸糕糊丸麻子太每十丸薄荷湯下

又方 治小兒痒眼赤爛用

苦參

夏荆子

防丰

胆草

玄參分等

猪胆糊丸麻子大數量大小茶清下

痒眼生瘡者用

瓜蘆根

升草

赤芍

決明分等

每五分蜜湯調下

爛弦者脾有濕熱也或初生洗不爭所致者用

淨黃連州

蒼朮

童便浸防分等

末每服一字蜜水調外用菴豆

耳童便

便淨七次半兩

海螵蛸錢一

胆丸

輕粉

雄黃各五分

用黃連乳汁浸清汁調藥以鷄羽蘸藥擦上一日

三五次以瘡為度

有因塵埃入目揩摩成腫帝哭不已作痛者用油烟
金墨新汲水磨濃入玄明粉分五如無以馬牙硝代之
和勻為膏取新筆蘸點目中以瘡為度忌熱物

凡眼暴赤腫初起勿服寒涼之藥不能愈疾又損脾
胃氣使兒不能飲食也蓋藥之味辛甘散為陽酸苦
湧洩為陰故清陽出上竅辛甘溫平是也酸苦寒涼
之藥不能上升耳宜先服九仙散發散之此火鬱則
發之也不已者以瀉青丸合小柴胡湯加酒黃連作
丸服有大奇功外當用金池散洗之黃連膏點之以

愈此治風熱眼病之要法也

九仙龍 時行自病暴赤腫痛以此發之

柴胡

蒼米

童便浸各一兩

赤芍

荆芥穗

耳草

各六銖半

麻黃

水浸不去根節

川芎

薄荷

和梗半兩

旋覆花

去毛梗三分

未

每

錢水一小碗姜一片葱一莖無時頻服

金沙散

時行赤眼腫痛或腎熱多淚

淨黃連

一兩

鵬砂

寒水石

大黃

各二錢

海螵蛸

銅青

各一錢

玄明粉

二錢

全蝎

七枚去毒

射

少

爛弦加

輕粉

五分

末每服一字至五分凉水化澄清去渣無時頻洗
故忌酒暈

黃連膏

用淨黃連半斤苦參四兩

秦皮二兩

杏仁

粉四十九

冬月製取雪水四碗煎二碗放淨磁器內又以水
煎取一碗放前汁內又以水一碗煎取半碗用淨
取汁與前汁和一處取淨銅銚子入汁在內慢火
熬以桑條不住手攪勿令沉底勿動灰塵入汁中
務宜仔細待熬至一碗再入馬牙硝半兩同煎至
半碗取起以紙蓋定再熬過蘆朮石末二兩

鵬砂

末半兩

乳香

一錢

沒藥

末一錢

胆丸

末三錢

海礪

二錢

和勻入膏中取起攤冷待乾以乳汁磨點之效

目直視者肝有熱也目連剝者謂之目開肝有風也

並宜服瀉青丸

目下胞腫青水氣也必待作腫宜五苓散加車前子

以利其水

目中黃者疸也宜服茵陳胃苓丸

兒有大病未愈觀其目或在視或斜視不轉睛者或

閉目不開者或開目不合者或哭無淚或不哭淚自

出者有目胞腫者有目陷汁有目中見物而畏怕者皆候

治鼻

鼻中相通呼吸門

唇依牙齒齒依唇

耳司採聽當嫌裏

舌主聲音以鋒銳

氣之主通竅於鼻。鼻清氣出入之道路也。小兒受胎氣充實者三關九竅五臟六腑內外呼吸內外貫通而榮衛行焉。若外感風寒內傷元氣傷乳食則清濁不分。泥丸相亂。諸症疊起矣。鼻衄者血與氣相隨而行。若臟腑積熱乘於氣血則

熱氣逼血而妄行自鼻孔出謂之衄血宜

東垣涼膈散加生黃

阿膠炒

黃連

茅花主之不止者宜服鷄蘇丸效

鷄蘇丸

治鼻熱胸中鬱熱衄血不止

鷄蘇葉

八分即薄荷葉

蒲黃

炒一兩

麥冬

二錢

阿膠

炒一錢

耳草

七分半

人參

黃芪

各五分

木香

柴胡

生黃

各一錢

煉蜜丸大每一丸食後茅花湯下

又方

山枝和殼燒存性油髮灰研勻吹入鼻

又方

槐花牛生半熟未吹鼻

又方 人中白成塊燒去穢氣為末入曲髮灰射之
許次入鼻

又方 生蘿蔔搗汁或生藕汁仰頭滴入鼻中或血
妄行取汁飲之效

又方 用大蒜煨香研爛塗脚底鼻中有蒜氣即去
之

用土方法不止以白紙一張作八摺冷水濕紙放頭
頂中以熨斗熨至一重或二重紙乾立止此數方救
急之要法也

鼻流清涕者熱則津液流鼻塞不通者冷則收閉也

鼻流清涕其症有二或外因傷風得之噴嚏流清涕
風為陽其病為熱宜東垣涼膈散加防丰芥穗主之
內因腦熱鼻流濁涕不止名曰鼻淵久而不已心白
血涼膈散加羌活川芎白芷主之

又方蒼耳散

辛夷仁

兩半

蒼耳子

錢半

白芷

兩

薄荷葉

分五

末茶清調服有因胃中食積熱痰流住者當消食

積用

南星

炮

半夏

洗

葉本

白芷

神曲

炒

酒芩

辛夷

荊芥等分末姜湯調服

二症有並用辛夷膏貼之

辛夷膏 治流涕不止

辛夷葉洗焙 二兩 細辛

木通

白芷

木香 各半兩 杏仁一兩六分

右末入杏仁泥羊腦髓猪脂各一兩和勻於瓦器中慢火熬成膏赤黃色為度放地上冷入腦射各一錢拌勻塗額門土更用少許塗鼻中

鼻塞其症有二。或因傷食得之者寒則傷肺肺氣不利則塞也。宜禦寒湯主之。若冷氣久不散濃涕結聚使鼻不聞香臭則為齠鼻。宜萬全膏主之。凡新產芽兒或十日一月之內勿然鼻塞因乳不能呼吸者

多是乳母睡時不知所忌抱兒身側鼻口中氣出吹着兒冷氣自頤而入成鼻塞並宜貼頤法及塞鼻法

萬全膏 治鼻臭

羌活

川芎

細辛

石菖蒲

木通

麻黃錢各一

腦射各一字

煉蜜丸芡實大服一九燈心湯化一二或用一洗綿包塞鼻中

禦寒湯 治寒邪傷於皮毛令兒鼻塞土喘

黃蘗

錢二

黃芪

錢一

人參

分五

炙草

款冬花

各三分

羌活

黃連

各二錢

白芷

防丰 各三分 陳皮 升麻各五分 佛柑 錢三

蒼术 分七 末葱湯調服

店願法 一名通散 香附 炒 川芎

羌活 炒 僵蚕 炒 細辛 荷葉

牙皂

用末生葱白搗膏以帛盛之夜貼額上

塞鼻法 治關鼻 瓜蒂 明瓦

細辛 各一分 雄黃 分五 射 許少

末以雄犬胆汁和丸綿包塞鼻中

鼻痒者肺痒也鼻下兩傍赤痒瘡濕其瘡不痛汁所

流涎隨即生瘡一名疳疔宜清肺飲化蠶丸主之

清肺飲 治肺疳蠶蝕鼻穿吼汁臭或生息肉

桑白皮炒半兩 紫蘇 前胡 黃芩

當歸 天冬 連翹 防丰

赤茯苓 桔梗 生黃各二錢半 甘草炙二錢半

末水煎服次服

化蠶丸 蕪荑 蘆薈 真青黛

川芎 白芷續 胡黃連 乾蟾燒存性

等分末猪胆汁浸糕糊丸麻子大二十九食後臨

卧杏仁湯下

其鼻昂用雄胆泡湯小筆蘸洗快愈藥各進數服宜

用

青黛

當歸

赤小豆

瓜蒂

地榆

黃連

蘆菖分

雄黃

許

細末入鼻內吹瘡

鼻瘡用

黃連

黃柏

柞柳

研末以猪骨髓和敷或用青黛

槐花

杏仁

丹敷

鼻亦用

雄黃

黃丹研

熱根水調敷又用

蒼耳葉

酒蒸乾

寒調服最解食毒

鼻乾者肺熱也用涼膈散加桑白皮

蜜水木通

夫病鼻乾黑燥者火剋金也鼻昂氣喘者肺絕也

小兒山根青者多病年上赤者有血光病

小兒腦疳鼻痒頭髮作穗面黃肌瘦用鯽魚膽滴鼻

中連三五日效

傷風寒頭痛加川芎

白芷

藁本

蔓荊子

細辛

眠痛加

酒連

羌活

防丰

柴胡

胆草

鼻病加

升麻

白芷

細辛

蘇葉

耳病加

柴胡

木香

蔓荊子

全蝎

口舌病加

石燕

防丰

咽喉痛加

玄参

牛旁子

山豆根

龍腦川芎丸

消風化滯除熱清痰通利七竅精神

氣莖

桔梗 二錢半

片腦 六分

砂仁 二

白豆蔻 土

五分

薄荷 一分 錢三

川芎

防丰

炙草

酒炙

連翹

各一錢

煉蜜丸每兩作二十九服則一二九茶清化下

頭病

小兒頭病亦多般

散出方書不多言

感謝岐師多指教

法晉後學作蹄筌

解顙者生下惟顙不合氣衰不盛也多憂多咲更與
目白睛多光白色放者多愁多喜以年久頭縫開解
而不合腎主髓腦為髓海腎氣有虧故髓不滿所以
頭顙開而不合也名曰解顙凡得此疾不及于日之
內間有救歲者偶因他疾攻擊遂成廢人不可復藥
也氣色清明能飲食者多服補腎壯黃丸及調元湯
可月內須見效者次第調理或有可治若投藥石如
故亦難矣

錢氏云兒本虛性由胎氣不成則神氣不足目中白

睛多其顙即解而色眊白此骨難養縱長不過二八之數若縱色欲多不過四旬而亡因病而成致腎虛者此也

家秘云解顙有二。初生後頭骨漸開此胎氣怯弱腎不足也有開而後開者自顙至印堂有破痕可開一分又有頭四破成縫者此皆解顙由病後腎虛水不勝火火氣上薰其髓則熱髓熱則解而頭骨復分開矣腎虛者宜服地黃丸以補腎之不足調元湯十全大補湯丹子共服之以補脾胃使氣血漸實其顙自合矣其髓熱者宜通聖散為丸服去硝不用外用封

願法或用新綿繫束之有作巾遮護之久而自合亦良法也

封願法

防丰

南星

白薇

白芨

分等

末猪灰脊髓搗和封願上一日三易之

又方

驢頭骨不拘多少燒灰存研末以清油調敷

頭縫

腦疔者頭皮光急髮結如蕪滿頭餅瘡胸熱如火肯

是也用

川芎酒

片苓酒

白芨

陳皮

去白冬

白木酒

當歸

酒各一

天麻酒

蒼朮

蒼朮子

各七錢

酒栢

錢四

酒粉草

防事

末水煎日服四五次服後睡片時乳母宜服

迦源解毒湯

酒茶

蒼朮酒

蔓荊子酒

白蒺藜

酒浸炒去刺

何首烏酒

胡麻炒

升麻酒

末酒糊麻子大服三五十九防丰湯下 外用

敷藥

松樹草灰

燒灰二兩

白膠香

一兩

黃丹

水飛一兩

枯白凡

五錢

黃芩

黃連

大黃

各出錢

蛇床

寒水石

各三錢

無名異

許少

木香

輕粉

未熬熱調敷瘡上先用椒鹽湯洗去瘡痂敷之佳
又治白禿

又有兒生後其頭漸大頭皮赤光眼小此亦腦痺也
乃受父母熱毒之氣藏於腎中上薰於腦故頭大漸
紅也此難養不出二八之數其未周歲滿頭生瘡結
餅作痒作痛兒不能忍日夜啼哭者亦難養也宜服
前苦參丸及松皮散敷之

癩頭者一名白禿或父母之傳或兄弟姊妹之相受
乃遺毒之氣也初起可治待皮毛光不必治也宜服

消風通聖散除大黃另研酒蒸炒末再酒拌晒乾每
一錢水煎熱服外用炭燒紅以長流水淬之乘熱
擦頭皮以前松皮散敷之

又方

胡荽子

伏龍肝

龍尾

黃連

桔白朮

末熬熱清油調敷初頭上散生成庖時常帶癢痒
毛髮稀少有類白癩此禿瘡之根也用臘猪油搽
之自不成白禿矣

顙填顙隔訣曰熱甚則腫虛熱則陷 顙填者顙門
腫起骨高突也經云熱甚則腫由火邪炎土使清明

之氣土升而不降其症有二以手摸之腫堅實者此有寒邪在表勝裡閉寒熱不得出所謂氣土沖則堅動者是也宜升陽散火湯此鬱則發之也如摸之其腫虛浮者此積熱在裏薰蒸於土所謂氣土冲則柔軟者是也宜酒製神芎丸此高則抑之也一發一下中病即止

升陽散火湯 治風寒外感或胃虛過食生冷抑遏陽氣脾土火鬱則發之

升麻

葛根

獨活

羌活

人參

白芍 各五分

防風 二分半

柴胡 八分

并草各三分

水煎熱服令膈有微汗

酒製神芩丸 治一切積熱

大黃酒蒸 黃芩酒洗二 黑丑半生半熟取

滑石各四錢 黃連酒洗 薄荷 川芎各

用無灰酒丸黍米大服五九十五丸溫水下

顛陷者謂顛門陷下或坑也其症有二經云陷者下

氣虛也大病之後津液不足真氣下陷成坑窟者宜

大補元氣調元湯加升麻主之有脾胃虛弱飲食或

少脾主肌肉由去皮薄顛門露見非陷也宜服肥兒

九參苓白朮散補脾胃則能飲食肌肉自平額不露矣

不有枕後陷者活切心書謂其症尤重於顙陷者此太虛極百無一活殊不知此非病也乃父母之過也物生兒頭骨未合當用菜豆作枕枕之常與移動勿使只在一邊則頭骨不正矣此後枕骨陷下者乃兒卧日久之所致也若難養則頭骨四破高下成縫者皆非壽子也

頭仰者頭軟也頭者頭之莖也一名天柱骨頸軟者乃天柱骨不能任元而前後左右顛倒也此惡病也

其症有二。小兒物生便頸軟者皆胎稟不足腎氣虛弱也。腎主骨脾主筋筋不束骨其骨則折切能令子虛也。此兒難養縱長不及四旬腎氣虛矣宜服地黃丸加當歸續斷主之。有因大病之後頭骨不能起者此血氣虛弱也。宜十全大補湯煉蜜丸服。經云頭者清明之府也。頭仰邪欹神將去矣。凡大病人有是症雖治有病驚風者或病瘵瘵者勿作項軟論。

傷風寒痛者用細根子

黃芩

半生半熟

炙草

半錢

羌活

桑木

各一錢

柴胡

七錢

川芎

五錢

或五分一錢以茶湯調成膏抹兒口中少用白湯下

頭搖者頭戰者腎風熱也宜瀉青湯丸加全蝎主之
頭生胞瘡者初因皮破成瘡膿水不乾頭髮粘結內
生風痒則抓之年久不愈有成癩頭當先去其風用
石菖蒲煎湯洗之其風盡死待乾用水銀膩粉一味
放碗中以指研勻入津調溫指蘸藥搽瘡上四畔及
髮內風盡去方用秋牛皮窰口上烟膠不拘多少松
香研末入輕粉少許雄黃少許熬熱青油調塗患處
頭生軟節者年久不愈用紫金丹塗之效

方見心虛
痛症下

頭之有髮猶山之有草木也髮者血之餘髮之多寡
申於血之盛衰也坎為而封血者腎之液髮者腎之
苗也故其色黑也兒髮久不生生不黑者皆腎虛也
宜地黃丸主之

大病後其髮成穗或稀少者乃津液不足疔癆之外
候也宜集聖散主之

面訐

五臟英華面部間

知其有病望中看

色宜明潤昏枯暗

瘡癬斑痕貌不訴

詩曰五氣人專藏於心肺上使五色脩明聲音能彰

則面者心肺之所主也。五臟部位說見一卷歌中。五色者五臟之英華發見於面者也。肝色青如翠羽者吉。枯草者凶。其餘照脉候倣此推之。大抵明潤者吉。暗黯者凶。五色主病。赤主熱。青主風。黃白主痺虛。食積。青黑主痛。五色所忌。肝病白者不治。謂金尅木也。病後面色白者。謂之脫色。皆死。肺病面赤者不治。謂火尅金也。凡痢疾失色。面赤者死。心病面黑者不治。水尅火也。脾病面赤青者不治。木尅土也。腎病面黃浮者不治。謂土尅水也。面浮腫者風也。宜五皮湯。加防風蘇葉主之。

頭面紅腫者風熱也用通聖散除大黃另用酒蒸大黃同末酒拌濕晒乾如此三拌三晒或半字一字淡竹瀝調細細服之連進三五次立止以忍冬藤煎湯洗之

面皮黃中有白癰者此傷食也宜三稜散

人參七錢半

三稜

香附一兩半

青皮

去穢

並智仁

陳皮

白

枳殼

麩

神曲

炒

麥芽

炒

半夏

炮

莢木

醋煮焙

山查肉

蘇葉

各五分

白茯苓

粉草

半生半炙

一

未服一錢半者五分陳倉米百粒姜引或加大黃

半生半煨五錢粳米糊九陳米飲下

面上生瘡如火燒用黃蠟米粉密水調敷或鴉子膏和敷

兒疥瘡不愈多生於面部兩耳乳母嚼白米成膏治之不過三五日愈並毋禁鵝魚

附錄醫按

小兒始病天庖瘡後發瘡發驚癇審翁因育嬰書問答症治開陳於後育書云此子先受暑濕之氣暑則為瘡濕則為瘡又傷飲食助其暑濕之和暑則傷心濕則傷脾暑生熱濕生痰脾土亦虧脾木隨旺此所

以爲瘡爲癰也。瘡曰食癰。久則成疔。觀其色。眇白毛
髮必疎。痒之候也。當從虛治。凡瘡間日發難止。謂受
病深也。夜發者難已。謂邪在陰分。必調至晝發。一日
一發。然後可以稱退。此理醫者當知。今將其病細解
於後。

問瘡發於子午時。又咬齒呻喚。又努嘔。出大便。其色
黃綠。又大哭。手足一撒。何也。答曰。此肝胆病也。子屬
胆。咬齒者。心肝俱熱。肝木心火。子以并病也。大叫哭
者。肝病也。呻喚者。腎病也。腎水肝木。母以子病也。肝
百厥陰。風木。心腎者。少陰君火也。木火相搏。則作。

摘故大便努青而出

瘡發於巳午時多而他時少其理何哉答曰巳為厥陰風木午為少陽君火且巳為陽極午為陰生此水火相搏而陰陽分爭之時也况瘡疾之作因暑以傷心心木屬火火之性又旺於巳傷水乘旺陰水觸動陽動於陰陰爭陽陽交戰寒暑交爭此瘡來一時增寒一時發熱者此也謂之巳午者不亦宜乎

瘡發時頭痛惡寒顛脊强者其理何哉答曰此邪併於太陽經也蓋膀胱所化此則陰實陽虛陽虛生外寒陰實生內寒中外皆寒故見其鼓顛而戰慄惡寒

莫任也。况太陽之脉連頭頂，連風府，在頭腦後行於腰脊，故見頭疼、腰脊強痛之症也。故名寒瘧、麻黃湯，活太陽經之汗藥也。故以為君，防風乃諸藥之卒徒也。故以為佐，甘草能和諸藥而煎解散，故以為使。有方乃攻濕之劑，臨病用藥不可執泥，而昧於通變也。瘧發時大熱大渴，自汗不得眠者，其理何哉？答曰：此邪併於陽明經也。蓋胃腑陽實而陰虛，陰虛生內熱，陽實生外熱，中外皆熱，故見其煩渴而身熱。惡熱莫任，况陽明者胃土也，蒸蒸發熱而汗出者胃之汗也。通身皆出者胃主肌肉也。土得熱則王，燥則主煩。

而心腎不安故不得眠也。當用白芷以解陽明之經。
石膏以清陽明之府。知母以養陽明之陰虛也。若便
實者此藥不足與也。宜下之後以木方調之。
瘡發時寒熱往來口苦喜嘔者其理何哉。答曰此邪
併於少陽經也。邪在表則惡寒邪在裏則發熱邪在
半表半裏則惡寒且熱故令寒熱交集矣。其經屬於
胆胆汁上溢故白口苦胆者肝之府邪初入府裡氣
逆而煩嘔此所以寒熱往來而口苦喜嘔之症見矣。
當用柴胡黃芩能和解少陽經之邪半夏生薑能散
經之嘔人參甘草能補中氣之虛所以防邪之入裡。

也

寢有一日一發。有二日一發。三月一發者。其理何哉。
答曰。氣舍於皮膚。與衛氣妍若。衛氣者。日行於陽。夜
行於陰。此氣得陽而外出。得陰而內薄。是以而作此
受之淺也。其氣之舍深內薄於陰。陽氣獨發。陰邪內
蓄。陰與陽爭。不得出。故間日作。此受之深也。邪氣與
衛氣客於六府。而有時相失。不能相爭。故數日作。此
受之最深也。

問發瘧之時。兒常用口吮母之乳。得乳即止者。何也。
答曰。此內熱作渴也。兒不能言。故欲得乳以解耳。

瘧後汗出初發無汗退而有汗何也答曰初發時邪
氣鬱寒多熱少故無汗及其退也寒去而熱盛此真
氣外泄故有汗也凡治無汗者要有汗以散邪為主
有汗者要無汗以養正為主此汗泄於外便瀉於內
心下跳腹中鳴皆火症也肝胆從火治此其法也
瘧退時後覺頭頂上常有小汗何也答曰傾瀉者乃
足厥陰肝經之脉所會處已上所開條論其大
畧也若大治法當專以治痺為主蓋小兒易虛易實
病不已虛則成痺當分二方治之一方治以平肝
為主內帶補脾藥一方治瘧以補脾為主內帶平肝

之藥可收全效幸遇秋金正旺木因水衰治不難矣
此疾勿庸速效幸遇五家世醫治病有法若遇粗工
欲求速效則攻補妄行欲速之害可勝言哉其毋當
忌鷄魚生冷諸物有衄血亦內熱也宜亟調之

加減當歸龍薈丸 治癰平肝

當歸

酒洗曬乾一錢

人參

川芎

雀腦

各一錢

胆草

酒浸

山枝仁

各五分

青皮

蘆薈

各七

甘草

軟節

柴胡

各一錢

半夏

大者三個七次切

生薑自然汁浸一時又以白朮水洗之用水煮神

曲糊丸粟米大二十五丸寅郊時淡竹葉湯下

加味參苓白朮散丸 治瘡補脾

人參

炙芪

白朮

歸身

酒洗一錢

炙草

青皮

各八分

陳皮

分

柴胡

夜明沙

木香

厚桂

去

澤泄

各五分

鱉甲

九助醋炙去爪二錢

使君子肉

一錢

白芍

酒洗一錢

山藥一兩煮糊丸粟米大已戌時每三十五各一

服炒米湯下

加味四物湯

乳母服

當歸

川芎

赤芍

生地

酒洗

柴胡

升麻

麥冬

木通去皮

黃芩酒洗

桔梗條五

薄荷一分

燈心十食後服